

CONTROVERSE AUTOUR DE LA MALADIE DE LYME

ILADS

- Manifestations cutanées
L'érythème migrant est présent dans 50 % des cas.
- Fiabilité des tests
Les tests actuels ne sont pas fiables, particulièrement dans les derniers stades de la maladie. Il faut donc se fier aux signes cliniques.
- Chronicité de la maladie
La maladie de Lyme chronique existe et peut devenir antibio-résistante. De longs traitements sont parfois nécessaires pour la traiter.
- Durée du traitement antibiotique
2 à 4 semaines de traitement ne sont pas toujours suffisantes, particulièrement dans les cas de diagnostic tardif. L'ILADS recommande des traitements au long cours pour les patients symptomatiques et chroniques.
- Diagnostic de la maladie
La Maladie de Lyme est sous diagnostiquée, et est responsable de nombreuses affections chroniques, entraînant quelquefois handicap et mort du patient.
- Bénéfices/risques d'un traitement au long cours.
Le risque d'un traitement au long cours est négligeable comparé aux risques de vivre avec une infection chronique.

IDSA

- La grande majorité des patients présente un érythème migrant.
- Après quelques semaines, les tests actuels permettent de détecter une maladie de Lyme.
- La maladie de Lyme chronique peut exister mais elle est extrêmement rare. Après un traitement antibiotique de 4 semaines, elle est éradiquée. Il ne reste que le syndrome Post Lyme...
- 2 à 4 semaines de traitement sont suffisantes. Un traitement au long cours n'est pas efficace, ni recommandé, même chez les malades chroniques.
- La Maladie de Lyme est sur-diagnostiquée et entraîne un usage irresponsable des antibiotiques.
- Un traitement au long cours est dangereux pour la santé et peut engendrer une résistance aux antibiotiques.